Playes d'armes à feu

N.° 21.

Observations communiquées à L'academie royalle de Chirurgie, par le Sieur Bauchot M.e en Chirurgie, aggrégé à Vannes, et Chirurgien Major en Survivance de L'hopital Militaire du Port-louis.

20. juin. 1755.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 59 n° 20

osseux seulement vers sa fracture inférieure. je Le regardois, pour ainsi dire, comme un Corps étranger, parceque j'en avois vû extraire de plus adhérens que luy, même du tibia, très nécessaire pour Le soutien de la Jambe; cependant après un peu de réflexion, j'ay pensé qu'il etoit convenable de tenter la réunion de cet os, par sa réduction. cet exemple n'est pas le seul qui m'ait convaincu d'un heureux succès, j'en ay eu plusieurs, et dans le nombre je rapporteray seulement La petite observation suivante parceque la fracture a eté faite par arme à feu.

troisieme observation Sur une fracture à L'os La pommette faite par une bale de Mousquet.

En 1747. la nommée annette fille de la baron du Port louis Reçut un coup de fusil par sa porte; qu'elle refusoit d'ouvrir à un soldat. La bale ayant traversé la dite porte déchira la peau en froissant La partie inférieure, et plus éminente du Zigoma qui en fut fracturé de maniere, que le Corps dudit os etoit vacillant, et comme replié du côté de L'orbitre, n'ayant cependant emporté qu'une petite esquille de son bord inférieur. L'on ne tarda point à m'appeller; je trouvay de plus outre La playe Extérieure des parcelles du bois de La dite porte Logées profondement sous L'arcade Zigomatique du côté de Lapophise du temporal qui étoit aussi fracturé à sa pointe: je soulevay très aisément tout Le Corps du dit os, pour extraire les dites parcelles, puis je Le repoussay pour Le réduire; je pansay Ladite playe mollement avec du Charpie trempé dans le vin Et fis une saignée du bras. ~~Le L~~

Le Lendemain je Levay L'appareil. il s'etoit formé une escarre; La paupiere ainsi que les parties voisines etoient Ecchimosées et extremement gonflées, Et La fievre s'allumoit. je remis L'appareil, en substituant au vin L'huile d'yppericum. je Réiteray deux saignées du bras, j'en fis une du pied La malade étant pletorique Et la réduisis à un regime Très sévere.

La suppuration ne s'est établie que Le Cinquieme jour pour avoir évité, je pense, les incisions à La face comme on L'observe d'ordinaire autant qu'il est possible: cependant les accidents n'ont pas eté considérables. L'Escarre s'est détachée peu à peu, Et j'appréhendois bien que L'os ne le suivît ou qu'il ne fournit de fréquentes exfoliations; mais au Contraire il s'est

fortifié dans sa place naturelle et il n'en a sorti que deux légeres esquilles, une de la face exterieure du bord qui avoit été emporté et l'autre de la partie superieure c'est à dire au dessous de l'orbître, endroit ou l'os avoit eté comme replié.

un petit abcès survenu le 18e jour à l'endroit de l'apophise temporale fracturée fut ouvert mais l'exfoliation ne fut pas sensible.

après la chute de l'escarre je ne me suis servi, excepté un deffensif convenable sur l'ecchimose que d'esprit de thérébentine addoucie par l'addition d'une partie egalle de miel de Narbonne. Le tout a été guéry en 32 jours. Les cicatrices que j'ay ménagées n'ont presque point restées difformes.

quatrieme observation

sur un poignet emporté par arme à feu.

En 1741. Etant Chirurgien Major de Vaur pour la Côte de Guinée nous rencontrames en mer un navire forban auquel nous fumes obligés d'envoyer plusieurs coups de Canons pour le faire eloigner. un Matelot, agé de 39 ans en bourroit un chargé pour la seconde fois et encore chaud. la poudre s'alluma le boulet partit et luy emporta totalement le poignet au dessus de l'articulaon même du muscle quarré pronateur. on le transporta tout de suite au poste. J'apperçu à l'extrémité de l'avant-bras plusieurs lambeaux des tégumens, et beaucoup de filamens restés des flechisseurs et extenseurs tant communs que propres. Il n'y eut presque point d'hémorrhagie lors de l'accident, mais un moment après l'artere radial et cubital fournissoient seulement comme à demi canal, et il ne fallut que la moindre compression du tourniquet pour arrêter le cours du sang.

J'avoüe que la premiere idée me porta à faire une nouvelle amputation, mais on s'y opposa en me disant qu'elle n'avoit été que trop faite et que d'ailleurs cet homme en mourroit toujours. ce contre-tems quoique occasionné par mon second et par des personnes qui n'étoient point de l'art, me fit réflechir davantage. J'examinay donc plus directement la partie affectée. en touchant l'extrémité du Cubitus et du Radius, je les trouvay sans beaucoup d'inégalité et ne m'appercevant d'aucunes fentes ni luxations, je fis attirer les tégumens du coté du coude.

pour en conserver davantage quoiqu'ils fussent frangés avec déperdition de Substance à Leur partie antérieure, puis je Coupay avec un grand bistouri demi courbé tout ce qui excédoit les dits os; je Lachay ensuite un peu Le tourniquet affin de remédier à L'hémorrhagie, qui nétant pas considérable, je me contentay de Comprimer les Vaisseaux par gradation avec des flocons de Charpie Sèche. Jaccommoday comme Je pus tout Le moignon, Et y appliquay mollement plusieurs Etoupades ou Couches de la même charpie, puis Le reste de L'appareil convenable, avec un bandage peu Serré: ayant ensuite abandonné Le tourniquet il ne parut Sortir aucune goutte de Sang.

La tension, La douleur vive, La fievre violente, accompagnée de délire et mouvemens convulsifs qui Survinrent les premiers Jours, obligerent à de fréquentes Saignées, aux émultions anodines Et à un régime très Sévère.

J'eus Soin d'humecter de douze en douze heures La partie avec une décoction Emolliante résolutive telle qu'on La peut faire en mer Et que J'animay Le 2e Jour. Le 5e je Levay une partie de L'appareil. Le bras, L'articulation du Coude étoient extremement gorgés ainsi que L'avant-bras mais La Circonférence de la playe nétant pas beaucoup enflammée Je fis couler Sur La Charpie adhérente principalement au Centre du Moignon de L'esprit de thérébentine addouci par L'addition du Miel de Narbonne dont L'usage má toujours assez bien réussi.

Le 7e Jour la fievre et autres accidens qui avoient Subsistés avec plus ou moins de Violences Se Calmèrent: L'appareil parut S'humecter Et Le gonflement diminuer.

Au pansement du 8e Jour une partie de La Charpie vînt Sans peine. J'en mis d'autres imbuës de même Esprit de Thérébentine. Le 9e tout sortit aisément, avec quelques portions d'Escarre, Et abondance de pus Lequel continua d'être mauvais pendant plus de 15 Jours, ce qui me faisoit craindre quelque désordre dans Les parties aponévrotiques dont on Sçait que L'avant-bras est fourni: cependant il ne S'y forma que deux petites fusées.

La Suppuration bien établie a Charroyé pendant Le premier mois beaucoup de filamens qui S'exfolioient Sans doute des extrémités des

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Tendons et parties aponévrotiques. je fus même obligé d'en couper quelques uns qui me gênoient par Leur Longueur, et je me servois alors d'un digestif ordinaire que j'animay souvent parcequ'il se faisoit une fonte considérable.

La précaution que j'avois prise de conserver autant qu'il me fut possible Les chairs au niveaux des os ne me servit pas beaucoup car outre La déperdition de substance qui les laissoit d'abord à découvert d'un demi pouce anterieurement, au bout de six semaines Ils excéderent partout du Double, Et leurs exfoliations qui se firent à La fin de deux mois ne les diminuerent que de deux à trois lignes. alors voyant que Le secours de remedes exfoliatifs ne nous favorisoit pas davantage, Le reste étant presque guéri d'ailleurs, je proposay d'emporter L'excédent desdits os avec La scie, mais Le malade n'y voulut point consentir; il aima mieux souffrir Le Cautere actuel que j'appliquay quatre fois en trois semaines avec La précaution de ratisser Le périoste après L'avoir coupé circulairement Et autres choses convenables.

Chaque application me fournissoit quelque tems ensuite Jusqu'à une Ligne et demie de fragmens que j'ébranlois dans des tems convenables pour en accelerer La Chute. Enfin par cette méthode je suis parvenu à rendre Les chairs excédentes au Lieu des os, Et n'ay rien négligé alors pour occasionner une bonne cicatrice. tout a réussi. La Cure qui a duré 98 Jours eut sans doute été abregée par La resection des os mais quand on s'oppose aux projets que nous croyons convenables L'on est heureux que L'art fournisse d'autres voyes de guérir.

C'est dans les cures ou il se trouve des oppositions semblables, qu'il paroit que Le Moyen du Cautere actuel ne doit pas être negligé. cet exemple prouve La nécessité d'y avoir recours, Et L'Experience confirme les bons effets qu'il produit en plusieurs occasions. Voicy un autre exemple des évenemens qui résultent faute d'en faire usage.

J'ay vû il y a trois ans un homme à qui il étoit arrivé un cas à peu près semblable au précédent. L'on n'avoit point fait

d'amputation, et les bouts des os qui se prolongeoient au dehors d'un pouce et demi à la fin du cinquième mois de traitement ne furent ni sciés ni cautérisés.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE